



# キク編



病害虫注意報  
2019年6月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

**白さび病・害虫注意！** 5月に引き続き、白さび病の発生しやすい季節です。循環扇、モヤコン等を活用して空気の対流と湿度を下げる環境づくりを徹底していきましょう！また気温の上昇に伴いアザミウマ類、ハダニ類の害虫の発生も増加します。悪天候が続く時期ですので、晴れの日には薬剤散布ができるよう天気予報に注意しながらしっかり予防を行きましょう！



## 今月のおすすめローテーション

生育初期	白さび病	ジマンダイセンフロアブル	500~800倍 -/8回
	アブラムシ類、ミカンイロアザミウマ、ハダニ類	アーデント水和剤	1,000倍 発生初期/5回

破蕾期	アザミウマ類 ハダニ類	アグリメック※	500倍 発生初期/5回	消灯時	ナミハダニ	マイトコーネフロアブル	1,000倍 開花前まで/1回
	白さび病 うどんこ病※ 黒斑病※ 灰色かび病※ ハダニ類※	ポリオキシソリンAL水溶剤	2,500倍 発病・発生初期/8回		白さび病	inochioオペラフラワー乳剤	2,000倍 発病初期/3回

発蕾期	白さび病、うどんこ病 アブラムシ類	ピリカット乳剤	白さび病、アブラムシ類は 1,000倍 うどんこ病2,000倍 発病・発生初期/6回
	アザミウマ類、アブラムシ類	inochioセイレーンフロアブル	2,000倍 発生初期/3回

※…花き類・観葉植物登録

地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がありますためご注意ください。展着剤、葉面散布剤などを加用する場合もご注意ください。

葉やけ・芽やけ対策に！

オランダ生まれ吹付式 白色遮光剤

# Q4ホワイト

使用量目安：1缶~/反 4ヶ月タイプ

※1缶/反使用で遮光率約30%

詳しくは営業担当まで  
ご連絡ください。

15L (20kg)/缶



新発売！

## グレースシア乳剤

希釈倍率：2,000倍  
適用害虫：ナミハダニ・ハスモンヨトウ  
発生初期 / 2回以内

幅広い害虫に速く効きます！  
新規有効成分が抵抗性害虫にも高い  
効果を示します!!

