



キク編



病害虫注意報 2019年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

涼しくなるとアザミウマの発生が再び増加します！他、病害虫にもご注意ください！

アザミウマ類、ハダニ類は、高温期には暑さによって一旦少なくなります。涼しくなると増えてきます。アザミウマ類が多発すると、ウイルスによるえそ病、茎えそ病の感染リスクも高くなるため注意が必要です。



今月のおすすめローテーション



地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合があります。ご注意ください。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。

白さび病の出やすい圃場は殺菌剤を定期的に散布することをおすすめします！

定植後	アブラムシ類、アザミウマ類、マメハモグリバエ	ダントツ粒剤	2g/株 生育期株元散布 発生初期/4回 ※アブラムシ類は6kg/10a, 1~2g/株
	アザミウマ類、アブラムシ類 ハダニ類	inochioセイレーン フロアブル	2000倍 発生初期/3回
生育初期	白さび病	ジマンダイセン フロアブル	500~800倍 -/8回
	ハダニ類	ダニコング フロアブル ※	2000倍 発生初期/1回
破蕾期	アザミウマ類 オオバコガ	プリンス フロアブル	2000倍 発生初期/5回
	ハダニ類 ハスモントウ	グレーシア 乳剤	2000倍 発生初期/2回
発蕾期	アザミウマ類、ハモグリバエ類※、 オオバコガ※、ヨウムシ類※	アフーム乳剤	1000倍 (アザミウマ類1000~2000倍) 発生初期/5回
	アブラムシ類 コジラミ類	コルト 顆粒水和剤 ※	4000倍 発生初期/4回
	白さび病	inochio オペラフラワー乳剤	2000倍 発病初期/3回

※…花き・観葉植物登録

すずみどり

香り成分で蒸散・光合成を促進

効果の持続期間は約1か月

ハウス内に吊るすだけ
10a当たり
10~20錠



カテキンパワー

茶葉から抽出した植物活力資材

弱った株の回復
樹勢維持に！

1,000倍
葉面散布もしくはどぶ漬け時に



新規登録薬剤！

ファインセーブ フロアブル

高い速効性と優れた残効性！

アザミウマ類
2000倍 発生初期/2回

