

殺菌剤

inochio

キクチヤ

粒
剤

プロベナゾール粒剤



白さび病に
抵抗する
力を活性化!

有効成分
「プロベナゾール」が
菊自身が持つ
病害抵抗性を活性化

キクッチャ 粒剤

規 格：5kg
成 分：プロベナゾール 8.0%
人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

特長1

●菊の病害抵抗性を誘導する

有効成分プロベナゾールを含む殺菌剤です。プロベナゾールは、通常の殺菌剤とは異なり、病原菌に直接作用するのではなく、菊自身が持つ病害抵抗性を活性化させるユニークな特長を持ちます。

特長2

●効果の持続性に優れる

定植時に処理することにより、有効成分プロベナゾールが根から吸収され、長期間にわたって、白さび病を予防します。初期防除に安定した効果が得られ、他散布剤と併せて体系的に処理することで、さらに高い防除効果が得られると考えられます。

特長3

●耐性菌が出にくい

プロベナゾールは直接病原菌に作用しないため、病原菌がプロベナゾールによって選抜されることはありません。プロベナゾールで誘導される様々な防御機構を全て打ち破ることのできる病原菌（耐性菌）が出現する確率は極めて低いと考えられます。

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
きく	白さび病	6~9kg/10a	定植時	1回	作条土壤混和	1回

散布体系のイメージ



⚠ 効果・薬害等の注意

- 有効年月内に使用してください。
- 農薬使用上の注意事項
本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所職員等、農業技術者の指導を受けることをおすすめします。

⚠ 安全使用上の注意

- 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
 - (1)誤食などのないよう注意してください。
 - (2)使用の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
 - (3)作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
 - (4)かぶれやすい体质の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けてください。
 - (5)夏期高温時の使用をさけてください。
- 保管……密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。

★使用前にラベルをよく読んでください。

★本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

★ラベルの記載以外には使用しないでください。

★空容器は、圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。

イノチオ精興園株式会社

〒726-0002 広島県府中市鵜飼町531-8 TEL.0847-40-0201 FAX.0847-40-0203