

きく専用殺虫剤

inochio  
FLOWERS

inochio

セイレーン

フロアブル

強〜い害虫も新しい効き目で **降参!**

ミカンキイロアザミウマ



ワタアブラムシ



ナミハダニ 適用拡大



© パイエルクロップサイエンス株式会社

inochio セイレーンフロアブルは、害虫の脂質生合成を阻害する殺虫剤です。  
きく登録のある殺虫剤として新規な作用性を持ち、薬剤への感受性が低下した  
難防除害虫にも安定した効果を発揮します。

inochio

セイレーン

フロアブルの特徴

- ✓ **新規作用で難防除害虫も降参!**
- ✓ **幼虫の成長を強力にストップ!**
- ✓ **優れた浸透移行性で、先まで届く!**



農林水産省登録 第 24163 号

イノチオ精興園株式会社

新規の作用

優れた浸透移行性

長い残効性


## きくの登録で初！

きくの登録農薬で初となる環状ケトエノール系の成分で、害虫の成長に必須な脂質生合成を強力にストップ。従来の薬剤に感受性が低下したアブラムシ類、ミナミキイロアザミウマにも高い効果を示します。

## 適用害虫と使用方法 殺虫剤分類 23

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
きく	アザミウマ類 アブラムシ類 ハダニ類	2,000 倍	100～ 300L/10a	発生初期	3回以内	散布	3回以内


## 植物体内で効果を発揮



散布された有効成分は速やかに植物体へ吸収され、害虫は植物体を吸汁することで成分を体に取り込み死に至ります。

有効成分は導管と師管の2つのルートを利用し、植物体内を上下へ移動します。この2方向の移行性により有効成分が植物体内にとどまり、害虫の防除効果が長く持続します。

## 使用時期



有効成分は生長点付近に移行するため、未展開葉やつぼみにとどまり、薬剤のかかりにくい部分に生息する害虫に効果が期待できます。

そのため、inochio セイレーンフロアブルは消灯前後から着蕾期頃の使用をおすすめします。

## 使用上の注意事項

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意してください。適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、周辺の桑葉にかからないようにしてください。
- 誤飲などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。

- 本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗いしてください。
- 本剤使用の際は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意してください。

## イノチオ精興園株式会社

〒726-0002 広島県府中市鞆町531-8 TEL.0847-40-0201 FAX.0847-40-0203

お問い合わせ | ホームページ: [www.seikoen-kiku.co.jp](http://www.seikoen-kiku.co.jp)