

KARETER

# 雑草退治 カレター<sup>®</sup>

除草剤

非選択性茎葉処理移行型

グリホサートイソプロピルアミン塩液剤

雑草の根まで枯らす！ うすめて使う除草剤



使用基準

グリホサートイソプロピルアミン塩…41.0%

注意事項

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当りの使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
果樹類 (かんきつ、パイナップルを除く)		一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)	250~500mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	3回以内	3回以内	
		多年生雑草		500~1,000mℓ				
かんきつ		一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	250~500mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	2回以内	5回以内	
		多年生雑草		500~1,000mℓ				
だいず	—	一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下) は種後出芽前まで (雑草生育期:草丈30cm以下) 畦間処理:雑草生育期 (草丈30cm以下) ただし、収穫前日まで	250~500mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	2回以内	4回以内	
						2回以内		
えだまめ			は種7日前まで(雑草生育期)			1回		
小麦	圃場内の周縁部	多年生イネ科雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)	250~1,000mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	3回以内	3回以内	
		一年生雑草	は種後出芽前(雑草生育期)	250~500mℓ				
		多年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)	500~1,000mℓ				
麦類 (小麦を除く)	—	一年生雑草	耕起7日前まで(雑草生育期)	250~500mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	1回	雑草茎葉散布	
			は種後出芽前(雑草生育期)					
			耕起又は播種7日前まで (雑草生育期)					
			100ℓ					
かんしよ	—	一年生雑草	耕起又は播種7日前まで (雑草生育期)	250~500mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	1回	雑草茎葉散布	
			100ℓ					
野菜類 (ほうれん草、キャベツ、だいこん、はつかだいこんを除く)	—	一年生雑草	耕起又は播種7日前まで (雑草生育期)	250~500mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	1回	雑草茎葉散布	
100ℓ								
とうがらし類 にんじん	—	一年生雑草	耕起又は播種7日前まで (雑草生育期)	250~500mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	1回	雑草茎葉散布	
100ℓ								
アスパラガス オリーブ(葉)	—	一年生雑草	耕起又は播種7日前まで (雑草生育期)	250~500mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	1回	雑草茎葉散布	
100ℓ								
キャベツ	—	一年生雑草	耕起又は播種7日前まで (雑草生育期)	250~500mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	1回	雑草茎葉散布	
100ℓ								
だいこん	—	一年生雑草	耕起又は播種7日前まで (雑草生育期)	250~500mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	1回	雑草茎葉散布	
100ℓ								
はつかだいこん	—	一年生雑草	耕起又は播種7日前まで (雑草生育期)	250~500mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	1回	雑草茎葉散布	
100ℓ								
ねぎ	—	一年生雑草	定植後畦間処理 ただし、 収穫30日前まで(雑草生育期)	250~500mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	3回以内	雑草茎葉散布	
100ℓ								
さとうきび (春植え)	—	多年生雑草	耕起10日前まで (雑草生育期)	500~1,000mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	3回以内	雑草茎葉散布	
100ℓ								
茶	—	多年生雑草	摘採7日前まで(雑草生育期)	500~1,000mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	3回以内	雑草茎葉散布	
100ℓ								
水田作物 (水稲を除く)	水田刈跡	一年生雑草	耕起20~10日前 (雑草生育期)	250~500mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	1回	雑草茎葉散布	
100ℓ								
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	多年生雑草	雑草生育期	500~1,000mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	1回	雑草茎葉散布	
100ℓ								
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)	250~500mℓ	通常散布 100ℓ 少量散布 25ℓ	2回以内	雑草茎葉散布	
100ℓ								
水田作物 (休耕田)	休耕田	多年生雑草	雑草生育期 (草丈50cm以下)	500~1,000mℓ	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	2回以内	雑草茎葉散布	
100ℓ								
樹木類	公園、庭園、堤とう、 駐車場、道路、運動場、 宅地、のり面、鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	500mℓ	通常散布 100ℓ 少量散布 25~50ℓ	4回以内	雑草茎葉散布	
100ℓ								
樹木等	公園、庭園、堤とう、 駐車場、道路、運動場、 宅地、のり面、鉄道等	多年生雑草	雑草生育期	1,000mℓ	通常散布 100ℓ 少量散布 25~50ℓ	3回以内	雑草茎葉散布	
100ℓ								
林	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類、クズ等の多年生雑草、 落葉雑草かん木	生育盛期以降	1,000mℓ	20~30ℓ	3回以内	雑草茎葉散布	

- 本剤はグリホサートを含む農薬であるので、他のグリホサートを含む農薬の使用回数も含め、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
- 近などで降った水は効果を低下させるので本剤の調整には用いないでください。
- 原液の加用の必要はありません。
- 本剤は土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。
- 本剤は散布時の雑草の草丈や葉面積が大きい程、効果が確実となるので、散布前に雑草の地上部を刈りむくってください。
- 本剤は通常2~14日で効果が現れ、効果発生までさらに日数を要するので、誤って再散布しないでください。
- スギナ防除に際しては、スギナの生育期を過ぎた時期での散布及びスギナが他雑草の中に埋没しているような条件では効果が劣る事があるので、適期にスギナにかかるように注意して散布してください。
- 処理後6時間以内の降雨は効果を低下させることがあるので、天候を良く見極めながら散布してください。
- 少量散布の場合は、少量散布ノズルを用いて、雑草の葉面に均一に散布してください。
- 水田への飛散、流入等により水稲に被害を生じるので、十分注意してください。
- 出芽前に使用する場合は、作物の出芽後に散布すると被害を生じるおそれがあるので、必ず出芽前に散布してください。
- 注入処理においては以下のことに注意してください。
  - ①クズには株間にナタなどで傷をつけ、薬液がよくしみ込むよう注入処理してください。
  - ②落葉雑草かん木には、樹幹の回りに等間隔にナタ目を入れ、薬液を注入処理してください。
  - ③処理竹から15m以内に発生したたけのこを食用に供さないでください。また、縄目や立て札によりたけのこが採取されないようにしてください。
- 雑草かん木に塗布処理を行う場合は、伐採後、直ちに切り口全面に直接塗布してください。
- 特に生育期離間散布に使用する場合はは作物にからまないよう十分注意して散布してください。
- 農作物や有用植物に薬液が付着すると、激しい被害が生じるので、からまないよう十分注意してください。
- 本剤の調整及び保管に際しては合成樹脂の容器類は使用しないでください。なお散布液を調整した容器及び散布器具は、使用後十分に水洗いしてください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除等関係機関の指導を受けてください。
- 土壌が流亡したり、くずれたりするおそれのある所では使用しないでください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、特に以下のことに注意してください。
  - ①水源地、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
  - ②散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に業者の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除等関係機関の指導を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手洗、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄目や立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 使用時の薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
- 水産動物(魚類)に影響を及ぼすので、養殖池等周辺での使用はさけること。
- 水産動物(魚類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
- 散布後は水管理に注意すること。

○使用前にはラベルをよく読んでください。 ○ラベルの記載以外には使用しないでください。 ○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ○容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。 ○防除日誌を記載しましょう。

本製品は農業用除草剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。本印刷物は現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

人畜毒性：普通物※

使い方▶▶▶

※「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、本剤を水でうすめ、噴霧器または目の細かいジョウロで雑草の茎葉にむらなく散布してください。 特定毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

**イノチオプラントケア株式会社** 〒441-8519 愛知県豊橋市若松町字若松 146  
 TEL.0532-25-5611 FAX.0532-25-5617  
 お問い合わせ | ホームページ: [www.inochio.co.jp](http://www.inochio.co.jp) メールアドレス: [info@inochio-plantcare.co.jp](mailto:info@inochio-plantcare.co.jp)